



કોવિડ ૧૯

રસી લેવાથી શું થઈ શકે?



સામાન્ય આડઅસર



હાથમાં સામાન્ય પીડા
ઇજ્ઝેક્ષન લીધું હોય તે જગ્યા એ
પીડા અને લાલાશ



સામાન્ય અશક્તિ
અને થાક



દુખાવો અને પીડા
માથાનો દુખાવો અને સ્નાયુ અથવા
સાંધાનો દુખાવો



સામાન્ય તાવ અથવા ઠંડી લાગવી
આ આડઅસર ઘટાડવા પુજળ પ્રવાહી
લેવું



૧૫ થી ૩૦ મિનિટ રાહ જુઓ

રસી આપ્યા પછી તમને ૧૫ થી ૩૦ મિનિટ
બેસવાનું કરેવામા આવશે જેથી રસી લીધા પછી જો
તમને કોઈ તાત્કાલિક આડઅસરનો અનુભવ થાય
તો એલજિક પ્રતિકિયાનો ઉપયાર કરવા માટે
એપાઇનફાઇન દવા(જ એલજી ને તરત જ
નિયંત્રણમાં લઈ લે છે) તે રસીના સ્થળે રાખવામા
આવે છે, અને સ્વસ્થયકર્મી કાર્યકરો પણ ત્યાં હાજર
હોવાથી તેનો તાત્કાલિક ઉપયાર થઈ શકશે.
**જો આડઅસરો સાત દિવસ કરતાં વધારે રહે તો,
અથવા તમને ચિંતા થાય તો તાત્કાલિક તબીબી
સહાય લેવી.**




અસામાન્ય આડઅસરો

બહુ થોડા લોકોને આ આડઅસરનો અનુભવ થાય છે.



ઉલટી



એલજિક પ્રતિકિયા

એલજી ચેતવણી

રસીના ઘટકોની માહિતી માટે તમારા
રસીકરણ સ્થળ ઉપર વિના સંકોચે પુછો

[Moderna Vaccine FAQs](#) | [Pfizer-BioNTech Vaccine FAQs](#)

Sources: [What to Expect after Getting a COVID-19 Vaccine | CDC](#)
[8 Things to Know about the U.S. COVID-19 Vaccination Program | Vaccines](#)
[Interim Clinical Considerations for Use of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine | CDC](#)